

எடுத்துக்காட்டு 8.3

கீழ்க்காணும் பரவலிற்கு, படிவிலக்க முறையில், சராசரியைக் காண்க.

பிரிவு இடைவெளி	0-8	8-16	16-24	24-32	32-40	40-48
நிகழ்வெண் (f)	10	20	14	16	18	22

தீர்வு:

ஊகச் சராசரி $A = 28$, பிரிவு நீளம் $c = 8$

பிரிவு இடைவெளி	மையப்புள்ளி x	நிகழ்வெண் f	$d = \frac{x - A}{c}$	fd
0-8	4	10	-3	-30
8-16	12	20	-2	-40
16-24	20	14	-1	-14
24-32	28	16	0	0
32-40	36	18	1	18
40-48	44	22	2	44
		$\sum f = 100$		$\sum fd = -22$

$$\begin{aligned}
 \text{சராசரி } \bar{X} &= A + \frac{\sum fd}{\sum f} \times c \\
 &= 28 + \left(\frac{-22}{100} \right) \times 8 \\
 &= 28 - 1.76 = 26.24
 \end{aligned}$$

8.4.4 கூட்டுச்சராசரியின் சிறப்புப் பண்பு (A special property of the Arithmetic Mean)

குறிப்பு

- x_i மற்றும் f_i -ன் மதிப்பு சிறியதாக இருக்கும் போது நேரடி முறையே சிறந்தது.
- x_i மற்றும் f_i -ன் மதிப்பு பெரியதாக இருக்கும் போது ஊகச் சராசரி அல்லது படிவிலக்க முறையைப் பயன்படுத்தலாம்.
- பிரிவு இடைவெளிகள் சமமில்லாமல் இருக்கும் போதும், அது எண் மதிப்பில் பெரியதாக இருக்கும் போதும் படிவிலக்க முறையைப் பயன்படுத்தலாம்.

1. சராசரியிலிருந்து, அனைத்து உறுப்புகளின் விலக்கங்களின் கூடுதல் பூச்சியம் ஆகும்.

$x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ என்ற n புள்ளிவிவரங்களின் கூட்டுச்சராசரி $\bar{X}$ எனில்

$$(x_1 - \bar{X}) + (x_2 - \bar{X}) + (x_3 - \bar{X}) + \dots + (x_n - \bar{X}) = 0 \text{ . எனவே } \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X}) = 0$$

2. தரவிலுள்ள ஒவ்வொரு உறுப்பிடனும் ஒரு மாறா மதிப்பு k ஐ கூட்டினாலோ அல்லது கழித்தாலோ முறையே அதன் சராசரியும் மாறா மதிப்பு k அளவு கூடும் அல்லது குறையும்.
3. தரவிலுள்ள ஒவ்வொரு உறுப்பிடனும் ஒரு மாறா மதிப்பு k , $k \neq 0$ ஆல் பெருக்கினாலோ அல்லது வகுத்தாலோ முறையே அதன் சராசரியும் மாறா மதிப்பு k ஆல் பெருக்கப்படும் அல்லது வகுக்கப்படும்.